

# Kimura®

Nutrizione equilibrata per piante sane



CONCIME CE • SOLUZIONE DI CONCIME A BASE DI RAME (SOLFATO)



**CONFEZIONE**  
FLACONI DA 1 LITRO IN SCATOLE DA 12 PEZZI  
TANICHE DA 5 LITRI IN SCATOLE DA 4 PEZZI



**APPLICAZIONE**  
FOGLIARE • FERTIRRIGAZIONE

## PROPRIETÀ PRINCIPALI

PREVIENE E CURA LA CARENZA DI RAME

MIGLIORA LO STATO NUTRIZIONALE DELLA PIANTA

PROMUOVE I MECCANISMI ENDOGENI DI DIFESA

AZIONE ANTISTRESS

## COMPOSIZIONE

• 9% (11,7% P/V) | RAME Cu SOLUBILE IN ACQUA

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

• DENSITÀ 1,31 kg/l; pH 9

Kimura® è un concime liquido a base di Rame chelato con amminoacidi vegetali di origine vegetale che conferiscono al prodotto un'ottima assimilabilità e traslocabilità nella pianta. Tra i suoi effetti segnaliamo il ruolo determinante nei processi enzimatici, nella fotosintesi, dotando le piante di resistenza contro le malattie e contribuendo a prevenirne l'insorgenza. La presenza di bagnanti e sinergizzanti rendono il prodotto adatto a molte colture per essere impiegato nell'arco dell'intero ciclo vegetativo come efficace coadiuvante ai programmi di difesa.

Kimura® è miscibile con i più comuni fertilizzanti e fitofarmaci, ad eccezione di quelli incompatibili con il Rame. Si consiglia sempre di realizzare una prova di miscibilità per verificare la compatibilità dei prodotti.



COLTURA	FASE D'IMPIEGO	DOSE LITRO/ETTARO	OSSERVAZIONE
Actinidia	Inizio della ripresa vegetativa, in post fioritura e dopo la raccolta	75 - 150 ml/hl	Applicazione fogliare
Uva da tavola e da vino	All'inizio della ripresa vegetativa, in post fioritura e dopo la vendemmia	Applicazione fogliare 100 - 300 ml/hl	Si raccomanda di aggiungere 1,5 l/ha di Kimura® in abbinamento ai prodotti utilizzati per la lotta alla peronospora per migliorarne l'efficacia.
Ortaggi	Durante tutto il ciclo vegetativo	50 - 150 ml/hl	Ripetere il trattamento ogni 10-12 giorni secondo l'andamento stagionale e la fase di sviluppo
Drupacee	Durante la primavera ed in autunno	75 - 150 ml/hl	Ripetere il trattamento ogni 10-12 giorni secondo l'andamento stagionale e la fase di sviluppo fogliare
Pomacee	Durante la primavera ed in autunno	75 - 150 ml/hl	Ripetere il trattamento ogni 10-12 giorni secondo l'andamento stagionale e la fase di sviluppo
Agrumi	In autunno	75 - 150 ml/hl	Evitare applicazioni in fioritura
Olivo	In primavera, durante lo sviluppo del frutto e in autunno	100 - 300 ml/hl	Applicazione fogliare



Kimura® è un prodotto consentito in agricoltura biologica Art.9 comma 3 del REG. UE 2018/848. È inoltre iscritto al registro dei fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica così come previsto dal D.LGS. 75/2010.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e culturali, si consiglia di consultare il Servizio Tecnico.

